

# Экспресс-маршрут

к выздоровлению



**Амоксициллин Экспресс**  
Полусинтетический антибиотик широкого спектра действия из группы пеницилинов в форме диспергируемых таблеток<sup>1</sup>

125 мг 250 мг 500 мг 1000 мг

<sup>1</sup> Следует принимать во внимание официальные руководства для каждого из показаний.

<sup>2</sup> Только в случае назначения амоксициллина в верхнем диапазоне доз следует рассматривать возможность применения два раза в сутки.

## Дети с массой тела < 40 кг<sup>1-5</sup>

| Показание к применению*                                                                                                                                                                         | Доза*                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Острый бактериальный синусит</li> <li>Острый цистит</li> <li>Острый пиелонефрит</li> <li>Дентальный абсцесс с воспалением подкожной клетчатки</li> </ul> | 40-90 мг/кг/сутки, разделенная на 2-3 приема**                                                                                                                                                                           |
| Острый средний отит                                                                                                                                                                             | 50-60 мг/кг/сутки <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           |
| Внебольничная пневмония                                                                                                                                                                         | 45-90 мг/кг/сутки, но не более 2000 мг/сутки <sup>5</sup>                                                                                                                                                                |
| Острый стрептококковый тонзиллит и фарингит                                                                                                                                                     | 40-90 мг/кг/сутки, разделенная на 2-3 приема**                                                                                                                                                                           |
| Тиф и паратиф                                                                                                                                                                                   | 100 мг/кг/сутки, разделенная на 3 приема                                                                                                                                                                                 |
| Профилактика бактериального эндокардита при хирургических процедурах в ротовой полости и верхних дыхательных путях                                                                              | 50 мг/кг перорально, однократная доза за 30-60 минут до хирургической процедуры в ротовой полости и верхних дыхательных путях                                                                                            |
| Болезнь Лайма                                                                                                                                                                                   | <p><b>Ранняя стадия:</b><br/>25-50 мг/кг/сутки, разделенная на 3 приема, в течение 10-21 дней.</p> <p><b>Поздняя стадия (системная инфекция):</b><br/>100 мг/кг/сутки, разделенная на 3 приема, в течение 10-30 дней</p> |

1. ИМП Амоксициллин Экспресс; 2. Острый синусит. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 3. Отит средний острый. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 4. Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 5. Пневмония (внебольничная). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2022. Информация предназначена для специалистов здравоохранения

## Взрослые и дети ≥ 40 кг<sup>1-5</sup>

| Показание к применению*                                                                                                                                                                                            | Доза*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Острый бактериальный синусит</li> <li>Острый средний отит</li> </ul>                                                                                                        | по 500-1000 мг 3 раза в сутки                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Бессимптомная бактериурия во время беременности</li> <li>Острый пиелонефрит</li> <li>Дентальный абсцесс с воспалением подкожной клетчатки</li> <li>Острый цистит</li> </ul> | 250 мг - 500 мг каждые 8 часов или 750 мг - 1 г каждые 12 часов<br>При тяжелых инфекциях 750 мг - 1 г каждые 8 часов<br>Для лечения острого цистита возможен прием по 3 г два раза в сутки                                                                                                                                                  |
| Острый стрептококковый тонзиллит и фарингит                                                                                                                                                                        | по 500 мг 2-3 раза в сутки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Обострение хронического бронхита                                                                                                                                                                                   | 500 мг 3 раза в сутки или 750 мг - 1 г 2 раза в сутки<br>При тяжелых инфекциях 750 мг - 1 г 3 раза в сутки в течение 10 дней                                                                                                                                                                                                                |
| Внебольничная пневмония                                                                                                                                                                                            | 500 мг - 1 г каждые 8 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тиф и паратиф                                                                                                                                                                                                      | 500 мг - 2 г каждые 8 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Инфекции протезированных суставов                                                                                                                                                                                  | 500 мг - 1 г каждые 8 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Профилактика бактериального эндокардита при хирургических процедурах в ротовой полости и верхних дыхательных путях                                                                                                 | 2 г перорально, однократная доза за 30-60 минут до хирургической процедуры в ротовой полости и верхних дыхательных путях                                                                                                                                                                                                                    |
| Эрадикация <i>Helicobacter pylori</i>                                                                                                                                                                              | 750 мг - 1 г два раза в сутки в комбинации с ингибитором протонной помпы (например, омепразол) и другим антибиотиком (например, кларитромицин, метронидазол) в течение 7 дней                                                                                                                                                               |
| Болезнь Лайма                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Ранняя стадия:</b> 500 мг - 1 г каждые 8 часов, максимальная суточная доза 4 г, разделенная на несколько приемов, в течение 14 дней (от 10 до 21 дня).</p> <p><b>Поздняя стадия (системная инфекция):</b><br/>500 мг - 2 г каждые 8 часов, максимальная суточная доза 6 г, разделенная на несколько приемов, в течение 10-30 дней</p> |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



**Амоксициллин + Клавулановая кислота Экспресс**  
Полусинтетический антибиотик широкого спектра действия из группы пенициллинов + бета-лактамаз ингибитор в форме диспергируемых таблеток<sup>1</sup>

125 мг+  
31,25 мг

250 мг+  
62,5 мг

500 мг+  
125 мг

875 мг+  
125 мг



**Цефиксим Экспресс**  
Полусинтетический антибиотик широкого спектра действия из группы цефалоспоринов III поколения в форме диспергируемых таблеток<sup>2</sup>

400 мг

| Вес, кг | Амоксициллин + Клавулановая кислота Экспресс <sup>3-6*</sup> | Цефиксим Экспресс <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3       | по ½ таб. 125 мг/31,25 мг 2 раза в сутки                     |                                |
| 4       | по ½ таб. 125 мг/31,25 мг 3 раза в сутки                     |                                |
| 5-6     | по 1 таб. 125 мг/31,25 мг 2 раза в сутки                     |                                |
| 7-8     | по 1 таб. 125 мг/31,25 мг 3 раза в сутки                     |                                |
| 9-12    | по 1 таб. 250 мг/62,5 мг 2 раза в сутки                      |                                |
| 13-17   | по 1 таб. 250 мг/62,5 мг 3 раза в сутки                      |                                |
| 18-24   | по 1 таб. 500 мг/125 мг 2 раза в сутки                       |                                |
| 25-39   | по 1 таб. 500 мг/125 мг 3 раза в сутки                       | 1 раз в день по ½ таб. 400 мг  |
| 40-49   | по 1 таб. 875 мг/125 мг 2 раза в сутки                       | 1 раз в день по ½ таб. 400 мг  |
| ≥50     | по 1 таб. 875 мг/125 мг 2 раза в сутки                       | 1 раз в день по 1 таб. 400 мг  |

1. ИМП Амоксициллин+КК Экспресс 2. ИМП Цефиксим Экспресс 3. Острый синусит. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 4. Отит средний острый. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 5. Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 6. Пневмония (небольшинная). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2022. Информация предназначена для специалистов здравоохранения

\*Режим дозирования препарата Амоксициллин+Клавулановая кислота Экспресс приведен в соответствии с официальными Клиническими рекомендациями МЗ РФ