ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фарингазон®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Фарингазон®

Международное непатентованное или группировочное наименование: амбазон

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания со вкусом и ароматом ванили; таблетки для рассасывания со вкусом и ароматом лимона; таблетки для рассасывания со вкусом и ароматом малины

Состав

1 таблетка для рассасывания содержит:

действующее вещество: амбазона моногидрат - 10,0 мг,

вспомогательные вещества: сахароза, лактозы моногидрат, какао-порошок, повидон К-30 (поливинилпирролидон среднемолекулярный), стеариновая кислота, ванилин или ароматизатор лимонный или ароматизатор малиновый.

.

Описание: круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-коричневого до коричневого цвета с фаской и риской с одной стороны, с характерным запахом. Допускается наличие светлых и темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний горла; антисептики

Код АТХ: R02AA01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает бактериостатическим действием. Оказывает местное противомикробное действие. Активен в отношении ряда грамположительных микроорганизмов (*Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus viridans*, *Pneumococcus*). На микрофлору кишечника не влияет.

Фармакокинетика

Оптимальная терапевтическая концентрация в слюне достигается на 3 – 4 день приема препарата при дозе 0,03 – 0,05 г/сутки.

Показания к применению

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и

глотки: тонзиллит, гингивит, стоматит, фарингит.

Противопоказания

- гиперчувствительность к амбазону и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата;
- непереносимость лактозы, фруктозы, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит лактазы;
- детский возраст до 3 лет (*в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности*).

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Перед применением препарата Фарингазон[®], если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно.

Таблетки следует рассасывать до полного растворения (через 15 – 30 минут после еды).

После применения таблеток следует воздержаться в течение 3 часов от питья и приема пищи.

Взрослым: по 4 – 5 таблеток (0,04 – 0,05 г) в сутки.

Детям: от 3 до 7 лет 3 таблетки (0,03 г) в сутки.

Курс лечения 3 – 4 дня.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Для определения частоты возникновения побочных эффектов препарата применяют следующую классификацию: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$ и $<1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$ и $<1/100$); редко ($\geq 1/10000$ и $<1/1000$); очень редко ($<1/10000$); частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).

Нарушения со стороны иммунной системы:

частота неизвестна: аллергические реакции.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:

частота неизвестна: кожная сыпь.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

Случаи передозировки амбазона неизвестны. Возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

Лечение

Антидота нет. При применении чрезмерной дозы рекомендуется промывание желудка, симптоматическая терапия.

При появлении симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Если Вы применяете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Фарингазон[®] проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не следует принимать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Препарат противопоказан пациентам с наследственной непереносимостью сахарозы и лактозы.

Увеличение дозы не оказывает большего клинического эффекта.

При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли следует обратиться к врачу.

Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном

применении препарата. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания со вкусом и ароматом ванили, 10 мг;

Таблетки для рассасывания со вкусом и ароматом лимона, 10 мг;

Таблетки для рассасывания со вкусом и ароматом малины, 10 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлорид/полиэтилен/поливинилденхлорид или пленки поливинилхлорид/поливинилденхлорид/поливинилхлорид или пленки поливинилденхлорид/поливинилхлорид/полиэтилен/ поливинилденхлорид и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (в пачке).

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18,
тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru

Производитель

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства",
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия
Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18,
тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru