

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Парацетамол детский,

суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная], 120 мг/5 мл

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»

(ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), Россия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная].	Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь [апельсиновая, клубничная, малиновая].
Состав на 5 мл препарата: <i>действующее вещество:</i> парацетамол – 120 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> [целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия] – 50 мг, камедь ксантановая (ксантановая смола) – 7,5 мг, метилпарагидроксибензоат (нипагин) – 5 мг, пропиленгликоль – 1 мг, сахара (сахар белый) – 1650 мг, глицерол (глицерин) – 630 мг, сорбитол (сорбит) – 1128,75 мг, ароматизатор апельсиновый или ароматизатор клубничный – 6,5 мг, натрия гидроксида раствор 2,4 %* – до pH 6,0, вода очищенная – до 5 мл. *Натрия гидроксида раствор 2,4 % готовят из натрия гидроксида и воды очищенной.	Состав на 5 мл препарата: <i>действующее вещество:</i> парацетамол – 120 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> [целлюлоза микрокристаллическая и кармеллоза натрия] – 50 мг, камедь ксантановая (ксантановая смола) – 7,5 мг, метилпарагидроксибензоат – 5 мг, пропиленгликоль – 1 мг, сахара (сахар белый) – 1650 мг, глицерол (глицерин) – 630 мг, сорбитол (сорбит) – 1128,75 мг, ароматизатор апельсиновый или ароматизатор клубничный или ароматизатор малиновый – 6,5 мг, натрия гидроксида раствор 2,4 %* – до pH 6,0, вода очищенная – до 5 мл. *Натрия гидроксида раствор 2,4 % готовят из натрия гидроксида и воды очищенной.
Форма выпуска Суспензия для приема внутрь [апельсиновая,	Форма выпуска Суспензия для приема внутрь [апельсиновая,

Старая редакция	Новая редакция
клубничная], 120 мг/5 мл. По 100 г или 150 г, или 200 г во флаконы из темного стекла 3 гидролитического класса, укупоренные полимерными крышками или полимерными крышками с контролем вскрытия и защитой от вскрытия детьми. По 100 г во флаконы из темного стекла 2 гидролитического класса, укупоренные полимерными крышками или полимерными крышками с контролем вскрытия и защитой от вскрытия детьми. Под крышками располагается пластиковый адаптер для шприца. Комплектация с мерной ложкой не включает адаптера. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку. Один флакон вместе с инструкцией по применению и с мерным шприцем или с мерной ложкой помещают в пачку из картона.	клубничная, малиновая], 120 мг/5 мл. По 100 г или 150 г, или 200 г во флаконы из темного стекла 3 гидролитического класса, укупоренные полимерными крышками или полимерными крышками с контролем вскрытия и защитой от вскрытия детьми. По 100 г во флаконы из темного стекла 2 гидролитического класса, укупоренные полимерными крышками или полимерными крышками с контролем вскрытия и защитой от вскрытия детьми. Под крышками располагается пластиковый адаптер для шприца. Комплектация с мерной ложкой не включает адаптера. На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку. Один флакон вместе с инструкцией по применению и с мерным шприцем или с мерной ложкой помещают в пачку из картона.

Представитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства»



Дубинина Л.Ю.