



## ТРИ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ КАШЛЯ<sup>1</sup>



Общее содержание вспомогательных веществ **до 30% меньше**, чем у препаратов с аналогичным составом<sup>1, 5</sup>




**Не содержит парабенов**, красителей и сорбиновую кислоту. Содержание ароматизаторов в 2 раза меньше<sup>1, 5</sup>



**Доступная цена<sup>6</sup>**



**Позволяет сократить** количество принимаемых ЛС за счет комбинации действующих веществ в составе<sup>7</sup>



## ИБУПРОФЕН

**ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ:**  
ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ,  
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ,  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ<sup>4</sup>



**Не содержит** в составе сахар и красители<sup>4</sup>



Двойная дозировка формы Форте позволяет задать **в 2 раза меньше лекарства для детей с 1 года<sup>9</sup>**



Знакомые вкусы **клубники и апельсина**, а также формы **без ароматизатора** для детей, склонных к аллергическим реакциям<sup>4</sup>

## АНТИБИОТИКИ ЭКСПРЕСС

**ЭКСПРЕСС-МАРШРУТ**  
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ



### АНТИБИОТИКИ

с улучшенными фармакокинетическими свойствами в форме диспергируемых таблеток<sup>\*8</sup>



Снижен риск **побочных реакций** со стороны ЖКТ<sup>\*8</sup>



Снижен риск **ошибок дозирования<sup>\*\*8</sup>**



**Риска на таблетках**  
125+31,25 мг<sup>3</sup> и 250 мг<sup>2</sup>



**Два варианта приема** - таблетку проглотить или растворить в воде и выпить<sup>3</sup>



1. ИПМ Бромгекомб, Бромгекомб экспекторант,  
2. ИПМ Амоксициллин ЭКСПРЕСС  
3. ИПМ Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС  
4. ИПМ Ибупрофен, Ибупрофен Форте ОАО  
«Фармстандарт-Лексредства»  
5. По сравнению с препаратом Аскорил и Аскорил

экспекторант (ИМП Аскорил, ИПМ Аскорил экспекторант)  
6. По данным сайта артека.ру по состоянию на 28.06.2024 г.  
7. Оковитый С.В., Анисимова Н.А. Фармакологические подходы к противокашлевой терапии // Болезни дыхательных путей // РМЖ – 2011. – №23. – С 9  
8. Зырянов С.К., Байбулатова Е.А. «Использование новых лекарственных форм антибиотиков как путь повышения эффективности и безопасности

антибактериальной терапии»  
9. По сравнению с препаратом Ибупрофен ОАО «Фармстандарт-Лексредства»  
10. Бронхит. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021  
11. Пневмония (внебольничная). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2022  
\* По сравнению с другими пероральными формами  
\*\* По сравнению с пероральными суспензиями



ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



# КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

ПНЕВМОНИИ (J18) и БРОНХИТОВ (острого J20 и затяжного) у детей



## ТРОЙНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ КАШЛЯ\*

Бромгексин + Гвайфенезин + Сальбутамол

### БРОМГЕКОМБ ЭКСПЕКТОРАНТ

3 раза в день, 4-5 дней  
с **2 до 6** лет: по 5 мл  
с **6 до 12** лет: по 5 или 10 мл  
с **12** лет: по 10 мл

### БРОМГЕКОМБ

3 раза в день, 4-5 дней  
с **6 до 12** лет: по ½ или 1 таб.  
с **12** лет: по 1 таб.



## КУПИРОВАНИЕ ЛИХОРАДКИ И ВОСПАЛЕНИЯ<sup>4</sup>

| Возраст          | Разовая<br>доза мл<br>ИБУПРОФЕН<br>ФОРТЕ | Объем<br>суспензии<br>на прием<br>ИБУПРОФЕН<br>ФОРТЕ | Разовая<br>доза мл<br>Ибупрофен | Объем<br>суспензии<br>на прием<br>Ибупрофен |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>3-12</b> мес  | -                                        |                                                      | 2,5 мл                          |                                             |
| <b>1-3</b> года  | 2,5 мл                                   |                                                      | 5 мл                            |                                             |
| <b>4-6</b> лет   | 3,75 мл                                  |                                                      | 7,5 мл                          |                                             |
| <b>7-9</b> лет   | 5 мл                                     |                                                      | 10 мл                           |                                             |
| <b>10-12</b> лет | 7,5 мл                                   |                                                      | 15 мл                           |                                             |
| с <b>13</b> лет  | 7,5-10 мл                                |                                                      | -                               |                                             |



## СИСТЕМНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ<sup>10,11</sup>

### Амоксициллин ЭКСПРЕСС

- От 3 мес до 12 лет с массой тела < 40кг 45-90 мг/кг/сутки в 2-3 приема, 5-10 дней
- Старше 12 лет с массой тела ≥ 40 кг по 500 мг 3 р/сутки или 750 мг - 1 000 мг 2 раза в сутки, 5-7 дней.
- При тяжелой инфекции: 750 мг – 1000 мг 3 раза в сутки, 10 дней

В случае предшествующей АБТ в последние 3 месяца\*:

### Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС

- От 1 года до 12 лет с массой тела от 10 до 40 кг 45-60 мг/кг/сутки в 2-3 приема (по амоксициллину) в течение 5-10 дней
- От 12 лет с массой тела ≥ 40 кг по 500 мг + 125 мг 3 раза/сутки или по 875 мг+125 мг 2 раза/сутки в течение 5-7 дней

\*При затяжном бактериальном бронхите рекомендуется Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС по 30-60 мг/кг/сут в 2-3 приема, продолжительностью терапии до 2 недель

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ