ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
острого тонзиллофарингита у детей

Комбинированная местная терапия ОТФ

МИТРАСЕПТИН-ПРО

3-6 лет
1 нажатие 3-4 раза/сут

7-14 лет
2 нажатия 3-4 раза/сут

старше 14 лет
3-4 нажатия 3-4 раза/сут

АМБАЗОН ФАРИНГАЗОН

3-7 лет
1 таблетка 3 раза в сутки (0,03 г/сут)

старше 7 лет
1 таблетка 4-5 раз в сутки (0,04-0,05 г/сут)

Симптоматическая терапия (купирование жара, боли в горле)

ПАРАЦЕТАМОЛ

с 6 лет
250 мг/ 5 мл

с 2х месяцев
120 мг/ 5 мл

ИБУПРОФЕН

от 1 года
40 мг/мл

от 3х месяцев
20 мг/мл

Системная антибактериальная терапия в течение 10 дней (при подтвержденной бактериальной этиологии)

Амоксициллин ЭКСПРЕСС
Таблетки диспергируемые: 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг.
Есть риска на таблетке 250 мг.

дети
50 мг/кг/сут в 2 приема, но не более 1000 мг/сут

взрослые и дети от 40 кг
500 мг 2-3 раза/сут

Амоксициллин + Клавулановая кислота ЭКСПРЕСС (от 1 года и/или от 10 кг)
Таблетки диспергируемые: 125+31,25 мг; 250+62,5 мг; 500+125 мг; 875+125 мг. Есть риска на таблетке 125+31,25 мг.

дети
40 мг/кг/сут по амоксициллину

взрослые и дети от 12 лет или массой тела от 40 кг
875/125 мг 2 раза/сут

Цефиксим ЭКСПРЕСС (от 25 кг)
Таблетки диспергируемые: 400 мг. Есть риска.

дети 25-50 кг
200 мг/сут

взрослые и дети >50 кг
400 мг/сут

Патогенетическая терапия вирусного конъюнктивита

ИНТЕРФЕРОН-ОФТАЛЬМО
Интерферон альфа-2b + Дифенгидрамин

1-2 капли 6-8 раз в день,
при улучшении частота применения может быть уменьшена до 2-3 раз в день

Острый тонзиллофарингит. Клинические рекомендации МЗ РФ. 2021г.

фармстандарт